

COVID-19 vakcinās

Registruotos ir skiepijamos vakcinos

- **Comirnaty (BioNTech & Pfizer)**
- **COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna)**
- Platforma - mRNR vakcina
- Efektyvumas - ~ 95 proc. (klinikinių tyrimų duomenys)
- Principinių skirtumų nėra

Comirnaty (BioNTech & Pfizer)

- skirta 16 metų ir vyresnių asmenų skiepijimui
- daugiadozė flakonas, skiedžiama vakcina
- praskiedus, viename flakone yra 6 dozės
- 1 dozė - 0,3 ml

Comirnaty (BioNTech & Pfizer) skiepijimo schema

- 2 dozės (po 0,3 ml)
- tarp dozių išlaikant bent 21 dienos pertrauką (ne mažiau kaip 21 diena), rekomenduojama, kad antra dozė būtų įskiepyta 21-28 dieną po pirmosios
- Skiepijimo schema (2 dozės) turi būti atliekamos Comirnaty vakcina
- Vakcinas negalima maišyti viename švirkšte su jokiais kitomis vakcinomis arba vaistiniais preparatais

Comirnaty (BioNTech & Pfizer) kontraindikacijos

- **Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai**
- **(kontrolinis klausimas apie turėtas alertines reakcijas į skiepus, vaistus, kitas medžiagas)**
 - ((4-hidroksibutil)azanedil)bis(heksan-6,1-dil)bis(2-heksildekanoatas) (ALC-0315)
 - 2-[(polietilenglikolio)-2000]-N,N-ditetradecilacetamidas (ALC-0159)
 - 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocholinas (DSPC)
 - Cholesterolis
 - Kalio chloridas
 - Kalio-divandenilio fosfatas
 - Natrio chloridas
 - Dinatrio fosfatas dihidratas
 - Sacharozė
 - Injekcinis vanduo

Atsargumo priemonės

- Po vakcinacijos pacientą rekomenduojama stebėti 15 minučių
- Jeigu po pirmosios Comirnaty dozės pasireiškė anafilaksija, antrosios vakcinacijos dozės skiepyti negalima

Kiti aspektai

- *Veiksmingumas*
 - Comirnaty gali apsaugoti ne visus paskiepytuosius
 - Apsauga 7 paros po antrosios vakcinos dozės
- *Nėštumas*
 - Patirties apie Comirnaty vartojimą nėštumo metu nepakanka
Nerekomenduojama skiepyti
- *Vartojimas kartu su kitomis vakcinomis*
 - Rekomenduojama, kad po paskutinio skiepijimo būtų praėjusios 14 dienų

Nepageidaujamas poveikis

- **Labai dažnas šalutinis poveikis** (gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių): skausmas, patinimas suleidimo vietoje, nuovargis, galvos, raumenų, sąnarių skausmas, šaltkrėtis, karščiavimas
- **Dažnas šalutinis poveikis** (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 žmonių): injekcijos vietos paraudimas, pykinimas
- **Nedažnas šalutinis poveikis** (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių): padidėję limfmazgiai, prasta savijauta, galūnių skausmai, nemiga, injekcijos vietos niežėjimas
- **Retas šalutinis poveikis** (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 000 žmonių): laikinas vienos veido pusės paralyžius
- **Dažnis nežinomas** (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis): sunki alerginė reakcija

Rekomendacinės formos Comirnaty (BioNTech & Pfizer) vakcinai

- Kontrolinis skiepų suaugusiems kontraindikacijų patikrinimo klausimynas
- Informavimas apie skiepus ir sutikimas skiepytis

COVID-19 Vaccine Moderna vakcina

- skirta 18 metų ir vyresnių asmenų skiepijimui
- daugiadozė flakonas, kuriame yra 10 dozių po 0,5 ml

- skiepijimo schema – 2 dozės (po 0,5 ml)
- antrąją dozę rekomenduojama suleisti praėjus 28 dienoms po pirmosios dozės suleidimo

- skiepijimo schema (2 dozės) turi būti atliekamos COVID-19 Vaccine Moderna vakcina
- Vakciną negalima maišyti viename švirkšte su jokiais kitomis vakcinomis arba vaistiniais preparatais

Nepageidaujamas poveikis

- **Labai dažnas šalutinis poveikis** (gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių): limfadenopatija, galvos skausmas, pykinimas / vėmimas, raumenų ir sąnarių skausmas, rkausmas injekcijos vietoje, nuovargis, Šaltkrėtis , Karščiavimas , Patinimas injekcijos vietoje
- **Dažnas šalutinis poveikis** (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 žmonių): išbėrimas, paraudimas injekcijos vietoje, išbėrimas injekcijos vietoje
- **Nedažnas šalutinis poveikis** (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių): niežėjimas injekcijos vietoje
- **Retas šalutinis poveikis** (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 000 žmonių): ūminis periferinis veido paralyžius, veido patinimas
- **Dažnis nežinomas** (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis): anafilaksija, padidėjęs jautrumas

- **KONTROLINIS SKIEPŲ SUAUGUSIESIEMS KONTRAINDIKACIJŲ PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS**
- **(Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 3 priedas, adaptuotas pagal COVID-19 VACCINE MODERNA indikacijas, kontraindikacijas ir atsargumo priemones)**
- **INFORMAVIMAS APIE SKIEPUS IR SUTIKIMAS SKIEPYTIS**
-
- Skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina **COVID-19 VACCINE MODERNA**

COVID-19 Vaccine Moderna vakcina

- Kontraindikacijos
 - Atsargumo priemonės
 - Kiti aspektai
-
- Tokios pačios kaip Comirnaty (BioNTech & Pfizer) vakcinos
 - Rekomendacinės formos COVID-19 Vaccine Moderna vakcinai